

Prodotti larvicidi presenti sul mercato per l'uso non professionale idonei al trattamento delle caditoie in area privata (marzo 2026). Eventuali prodotti di recente introduzione non sono inseriti perché non ancora sottoposti a prove di campo.

Prodotto commerciale	Tipo di formulazione	Principio attivo/sostanza ad azione larvicida	Formato	Dose consigliata per caditoia*	Indicazioni in etichetta:		Periodicità di trattamento consigliata
					Efficacia e/o persistenza	Periodicità di trattamento	
Aquatain AMF	Olio pronto all'uso	Polidimetilsiloxano (PDMS silicone) 89%	Flaconcino da 50 ml	3-5 ml (150-250 gocce)	Almeno 4 settimane	nd	3 settimane
Aquatain Drops	Capsule pronte all'uso	Polidimetilsiloxano 0,25 ml/capsula (PDMS silicone 89%)	Astuccio da 1 blister (15 compresse) Astuccio da 2 blister (30 compresse)	4-12 capsule	Almeno 4 settimane	nd	3 settimane
Siliqua	Olio pronto all'uso	Dimeticone 100%	Flaconcino da 50 ml	3-5 ml (150-250 gocce)	3-4 settimane	nd	3 settimane
Mosquitorex	Olio pronto all'uso	Oli e sostanze di origine vegetale	Fiale da 5 ml	5 ml	3 settimane	2-4 settimane	3 settimane
X-Larv	Olio pronto all'uso	Oli e sostanze di origine vegetale	Flacone da 50 ml	5 ml (200 gocce)	da 1 a 2 settimane	nd	2 settimane
Proxilar compresse	Compresse da 1g pronte all'uso	Pyriproxyfen 0,5%	Barattolino da 10 compresse	1 compressa	Fino a 4 settimane	3-4 settimane	3 settimane

Prodotto commerciale	Tipo di formulazione	Principio attivo/sostanza ad azione larvicida	Formato	Dose consigliata per caditoia*	Indicazioni in etichetta:		Periodicità di trattamento consigliata
					Efficacia e/o persistenza	Periodicità di trattamento	
Bio Tiger Tab - Larvicida	Compresse effervescenti pronte all'uso	Pyriproxyfen 0,5%	Flacone da 10 compresse	1 compressa	2-3 settimane	2-3 settimane	3 settimane
Zanzaricida-Larvicida compresse	Compresse	Pyriproxyfen 0,5%	Flacone da 20 compresse	1 compressa	nd	2-3 settimane	3 settimane
Mosquito chips	Compresse	Pyriproxyfen 0,027%	9 Blocchetti	1 Blocchetto	nd	3 mesi	1 settimane
Culinex Tab	Compresse	<i>Bacillus thuringiensis israelensis</i>	2 blister da 10 compresse	1 compressa	nd	15 giorni	1 settimana

*Dosi ottenute da prove condotte in campo nelle nostre condizioni ambientali